



Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, 2008–2009-es tanév

**MATEMATIKA, III. kategória**

Döntő, a gimnáziumok speciális matematikai osztályai részére

**Fontos tudnivalók:**

1. A dolgozaton **nem szabad feltüntetni a versenyző nevét**. A kidolgozás során felhasznált minden papírlapra írja fel a tanuló a **számjelét**.
2. A feladatok megoldására fordítható idő: **5 (öt) óra**. A feladatok megoldásához bármely tárgyi segédeszköz (szakkönyv, példatár, zsebszámológép stb.) szabadon használható (kivéve, ha a feladat szövege megtiltja pl. számítógép használatát). Egyébként azonban **önállóan kell dolgozniuk** a versenyzőknek (és telefon, internet stb. sem használható). Programozható zsebszámológép igénybevétele esetén mind a feladat megoldását szolgáltató programot, mind pedig magát a megoldást meg kell adni.
3. Ha a versenyző valamelyik feladat megoldásában olyan ismeretre támaszkodik, amely nem szerepel a kategóriájának matematika törzsanyagában, akkor *pontosan* hivatkoznia kell arra a forrásra, ahonnan azt merítette. A versenybizottság csak kellően megindokolt megoldásokat fogad el, **az eredmény puszta közlése nem értékelhető**. Nem fogadható el könyvből, példatárból stb. olyan feladatra történő hivatkozás sem, amely feladatnak a megoldása ott nincs kidolgozva.
4. A dolgozathoz **nem szükséges fogalmazványt** (piszkozatot) **készíteni**, de törekedni kell a megoldások világos, szabatos megfogalmazására és áttekinthető, olvasható leírására. A **feladatokat tetszés szerinti sorrendben** lehet megoldani, lehetőleg feladatonként új oldalon. Valamely feladatra adott második megoldás nem pótolja egy másik feladat hiányzó megoldását.
5. A dolgozatok elbírálásának megkönnyítése céljából kérjük a versenyzőket, hogy minden darab papírt adjanak be, amelyen érdemleges munkát végeztek. A verseny feladatait tartalmazó feladatlapot a versenyzők megtarthatják.
6. Azokat a versenyzőket, akiknek dolgozatából kétségtelenül megállapítható együttműködésük, **kizárjuk a versenyből**.

Budapest, 2009. március

A versenybizottság

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, 2008–2009-es tanév  
**MATEMATIKA, III. kategória**  
A döntő feladatai  
a gimnáziumok speciális matematikai osztályainak tanulói részére

1. Mutassuk meg, hogy ha  $a_1, a_2, a_3, \dots$  tetszőleges pozitív számok, akkor

$$\sum_{i=1}^{\infty} 1/a_i = \infty \quad \text{és} \quad \sum_{i=1}^{\infty} a_i/i^2 = \infty$$

közül legalább az egyik teljesül. (Pozitív  $c_1, c_2, \dots$  számok esetén  $\sum_{i=1}^{\infty} c_i = \infty$  azt jelenti, hogy az  $s_k = c_1 + c_2 + \dots + c_k$  összegek  $k$  növekedésével minden határon túl nőnek.)

2. Vetítsük az  $ABCD$  szabályos tetraédert merőlegesen egy a térben fekvő számegyenesre, és legyenek a csúcsok vetületei rendre az  $a, b, c, d$  valós számok. Fejezzük ki a tetraéder élhosszát  $a, b, c$  és  $d$  segítségével.
3. Egy nap egy méhraj egy különlegesen szép fa virágjairól gyűjtötte a mézet. Minden méhecske legfeljebb 100-szor látogatott el a fához, két-tőnél többen sohasem voltak egyszerre ott, de bármelyik két méhecske találkozott valamikor egymással a fánál. Maximálisan hány méhecskéből állhatott a méhraj?



Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, 2008–2009-es tanév

**MATEMATIKA, III. kategória**

a gimnáziumok speciális matematikai osztályainak tanulói részére

**A döntő feladatainak megoldásai****1. feladat.**

Mutassuk meg, hogy ha  $a_1, a_2, a_3, \dots$  tetszőleges pozitív számok, akkor  $\sum_{i=1}^{\infty} 1/a_i = \infty$  és  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i/i^2 = \infty$  közül legalább az egyik teljesül. (Pozitív  $c_1, c_2, \dots$  számok esetén  $\sum_{i=1}^{\infty} c_i = \infty$  azt jelenti, hogy az  $s_k = c_1 + c_2 + \dots + c_k$  összegek  $k$  növekedésével minden határon túl nőnek.)

**Megoldás:** Tegyük fel indirekt, hogy  $\sum_{i=1}^{\infty} 1/a_i < \infty$  és  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i/i^2 < \infty$ , azaz van olyan  $T$  szám, amellyel minden  $k$ -ra

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_k} < T \quad \text{és} \quad a_1 + \frac{a_2}{4} + \dots + \frac{a_k}{k^2} < T. \quad (1)$$

A számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség alapján

$$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{a_i} + \frac{a_i}{i^2} \right) \geq \sqrt{\frac{1}{a_i} \cdot \frac{a_i}{i^2}} = \sqrt{\frac{1}{i^2}} = \frac{1}{i}.$$

Ezt  $i = 1$ -től  $k$ -ig összegezve, (1) felhasználásával kapjuk, hogy bármely  $k$ -ra

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k} \leq \frac{1}{2} \left( \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_k} + a_1 + \frac{a_2}{4} + \dots + \frac{a_k}{k^2} \right) < T. \quad (2)$$

Az egyenlőtlenség bal oldalán álló összeg (az  $1 + (1/2) + (1/3) + \dots + (1/k) + \dots$  úgynevezett *harmonikus sor* kezdőszelete) azonban minden határon túl nő:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}, \dots, \quad \frac{1}{2^r+1} + \dots + \frac{1}{2^{r+1}} > 2^r \cdot \frac{1}{2^{r+1}} = \frac{1}{2}$$

alapján

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2^j} \geq \frac{j+2}{2}.$$

Ez  $j \geq 2T - 2$  esetén ellentmond (2)-nek.

**2. feladat.**

Vetítsük az  $ABCD$  szabályos tetraédert merőlegesen egy a térben fekvő számegyenesre, és legyenek a csúcsok vetületei rendre az  $a, b, c, d$  valós számok. Fejezzük ki a tetraéder élhosszát  $a, b, c$  és  $d$  segítségével.

**Első megoldás:** Legyen a keresett élhossz  $e = \sqrt{2}m$ . Foglaljuk a tetraédert egy  $m$  élhosszú kockába, amelyben a tetraéder élei lapátlók. Vegyük fel a térben azt a koordinátarendszert, amelyben  $A$  az origó, a  $B, C, D$  csúcsok koordinátái pedig rendre  $(0, m, m)$ ,  $(m, 0, m)$ , illetve  $(m, m, 0)$ , azaz a tengelyek a kocka origóból kiinduló éleinek irányába mutatnak.

Toljuk el a számegyeneset önmagával párhuzamosan úgy, hogy az origója az  $A$  pontba kerüljön. Ekkor a  $B, C, D$  pontok vetületei rendre  $(b - a)$ ,  $(c - a)$  és  $(d - a)$  lesznek. Legyenek a számegyenes 1 pontjának koordinátái  $(\alpha, \beta, \gamma)$ , ekkor persze

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1.$$

A  $B$  pont vetülete a számegyenesen az  $\overrightarrow{AB}$  vektornak és az  $(\alpha, \beta, \gamma)$  vektornak a skaláris szorzata; hasonló érvényes a  $C$  és  $D$  pontokra. Ezért

$$m \cdot \beta + m \cdot \gamma = b - a$$

$$m \cdot \alpha + m \cdot \gamma = c - a$$

$$m \cdot \alpha + m \cdot \beta = d - a.$$

Innen  $m \cdot (\alpha + \beta + \gamma) = (b + c + d - 3a)/2$ , vagyis

$$m\alpha = (c + d - b - a)/2$$

$$m\beta = (b + d - c - a)/2$$

$$m\gamma = (b + c - d - a)/2.$$

Ezekből

$$\begin{aligned} 2m^2 &= 2m^2(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) \\ &= ((c + d - b - a)^2 + (b + d - c - a)^2 + (b + c - d - a)^2)/2, \end{aligned}$$

ahonnan a tetraéder élhossza

$$\begin{aligned} e = \sqrt{2}m &= \sqrt{((c + d - b - a)^2 + (b + d - c - a)^2 + (b + c - d - a)^2)/2} \\ &= \sqrt{\frac{3}{2}(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) - (ab + bc + ca + ad + bd + cd)}. \end{aligned}$$

**Második megoldás:** Legyenek először  $OP$ ,  $OQ$  és  $OR$  páronként merőleges egységnyi hosszúságú szakaszok a térben. Állítjuk, hogy ha ezeket a szakaszokat a térben fekvő tetszőleges egyenesre merőlegesen vetítjük, akkor a vetületek hosszának négyzetösszege 1 lesz.

Feltehető, hogy a szóban forgó egyenes áthalad az  $O$  ponton. Vegyünk fel rajta egy  $X$  pontot  $O$ -tól egységnyi távolságra, és vetítsük  $X$ -et az  $OP$ ,  $OQ$ ,  $OR$  egyenesekre. Miután egységnyi szakasz vetületének a hossza csak a két egyenes által bezárt szögtől függ, az  $OX$  szakasz három vetületének a hossza rendre egyenlő az  $OP$ ,  $OQ$ ,  $OR$  szakaszoknak az  $OX$ -re eső vetületei hosszával. Ezért a szóban forgó négyzetösszeg egyenlő az  $X$  pont koordinátáinak a négyzetösszegével az  $OP$ ,  $OQ$ ,  $OR$  által kifeszített koordinátarendszerben, azaz 1-gyel.

A fentiekből következik, hogy egy egységnyi élű kocka összes élét a tér bármely egyenesére merőlegesen vetítve az élek vetületeinek a négyzetösszege az egyenes helyzetétől

függetlenül mindig 4 lesz – és így  $x$  élhosszú kocka esetében  $4x^2$  –, hiszen az élek rendszerét négy darab, páronként merőleges élekből álló élhármas egyesítéseként kapjuk.

Rátérünk a feladat megoldására. Az adott tetraéderrel együtt vetítsük a köré írható kocka éleit is a megadott egyenesre. A tetraéder élei ennek a kockának lapátlói, mégpedig mindegyik lapon az egyik.

Könnyen ellenőrizhető, hogy a paralelogrammáknak az a jól ismert tulajdonsága, mely szerint az oldalak négyzetösszege egyenlő az átlók négyzetösszegével, érvényes elfajuló paralelogrammákra is, tehát alkalmazható a kocka lapjainak az egyenesre eső vetületeire. Ha ezeket az egyenlőségeket felírjuk a kocka mindegyik lapjának vetületére és összeadjuk őket, akkor egyrészt megkapjuk a kocka összes élei vetületei négyzetösszegének a kétszeresét (mert mindegyik él két laphoz tartozik), másrészt a tetraéder élei vetületei négyzetösszegének a kétszeresét (mert a kocka bármelyik két párhuzamos lapátlója közül pontosan az egyik tartozik a tetraéderhez).

Tehát a tetraéder élei vetületeinek a négyzetösszege egyenlő a köré írt kocka élei vetületeinek a négyzetösszegével.

Jelölje  $e$  a tetraéder élhosszát, ekkor a köré írt kocka élhossza  $e/\sqrt{2}$ . A szóban forgó négyzetösszeg az előzetes megjegyzésünk szerint a kocka élhossza négyzetének a négyszerese, vagyis  $4(e/\sqrt{2})^2 = 2e^2$ . Ebből a

$$2e^2 = (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 + (a-d)^2 + (b-d)^2 + (c-d)^2$$

egyenletet kapjuk, ahonnan

$$e = \sqrt{\frac{3}{2}(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) - (ab + bc + ca + ad + bd + cd)}.$$

### 3. feladat.

Egy nap egy méhraj egy különlegesen szép fa virágjairól gyűjtötte a mézet. Minden méhecske legfeljebb 100-szor látogatott el a fához, kettőnél többen sohasem voltak egyszerre ott, de bármelyik két méhecske találkozott valamikor egymással a fánál. Maximálisan hány méhecskéből állhatott a méhraj?


**Megoldás:** Megmutatjuk, hogy a keresett maximum 200, és általában 100 helyett  $n$  látogatás esetén  $2n$ .

1. Először azt igazoljuk, hogy a  $2n$  megvalósulhat, és erre két bizonyítást is adunk.

Az első bizonyításhoz tekintsünk egy szabályos  $2n$ -szöget, a csúcsait számozzuk meg 1-től  $2n$ -ig. A sokszög oldalai és átlói (a továbbiakban hívjuk ezeket közös névvel szakaszoknak) éppen megfelelnek az  $1, \dots, 2n$  számokból képezett (rendezetlen) számpároknak. Mindegyik szakasz vagy egy (szemközti oldalakból álló) oldalpárral párhuzamos, vagy pedig olyan „legrövidebb” átlópárral, amelyek másodsomszédos csúcsokat kötnek össze (a párhuzamosságba most és a továbbiakban az egybeesést is beleértjük). Osszuk a szakaszokat  $n$  csoportba a következők szerint: az első csoportba az 12-vel, valamint 13-mal párhuzamos szakaszok kerülnek; a másodikba a 23-mal és 24-gyel párhuzamosak stb., végül az  $n$ -edik csoportba az  $n, n+1$ -gyel, valamint  $n, n+2$ -vel párhuzamosak. Így minden szakasz pontosan egy csoportba tartozik, és minden csoportban pontosan  $n + (n-1) = 2n-1$

szakasz van (lásd az ábrát). Az egy csoportba tartozó szakaszok egy töröttvonal mentén helyezkednek el.

Ezek után a méhek repüljenek a következőképpen. Menjünk végig az első töröttvonal csúcsain. Mind a  $2n$  csúcs pontosan egyszer fog előfordulni. A sorozat a 2-es csúccsal kezdődik, aztán így folytatódik: 1, 3,  $2n$ , 4,  $2n - 1$ , 5, ..., végül  $n + 3$ ,  $n + 1$ ,  $n + 2$ -vel fejeződik be.



Elsőként a 2-es méh repül a fára. Ott megvárja az 1-est, majd elrepül. Az 1-es megvárja a 3-ast, aztán elrepül. A 3-as megvárja a  $2n$ -est, aztán elrepül stb. A végén az  $n + 1$ -es megvárja az  $n + 2$ -est, és elrepül, majd az  $n + 2$ -es is elrepül.

Ezt mindegyik csoportra megcsinálják. Ekkor minden méh mindegyik másikkal találkozott a fán, és mivel  $n$  csoport van, minden méh pontosan  $n$ -szer látogatta meg a fát.

A második bizonyítás  $n$  szerinti teljes indukcióval történik.  $n = 1$ -re az állítás nyilvánvaló.

Tegyük fel, hogy  $n$ -re igaz, és az  $1, 2, \dots, 2n$  sorszámú méhek röptét megszerveztük úgy, hogy mindegyikük mindegyikkel találkozott, és mindegyikük legfeljebb  $n$ -szer járt a fánál. Ezt most úgy folytatjuk a  $2n + 1$  és  $2n + 2$  sorszámú méhvel, hogy ezek egymással és a többiekkel is találkozzanak, a régiek már csak egyszer repüljenek a fához, az újak pedig  $n + 1$ -szer. Ezt meg tudjuk valósítani, ha az alábbi sorrendben egy-egy méh odarepül, megvárja a következőt, majd elrepül, és a legvégén az utolsó elrepül:  $2n + 1$ , 1,  $2n + 2$ , 2,  $2n + 1$ , 3,  $2n + 2$ , ...,  $2n + 1$ ,  $2n - 1$ ,  $2n + 2$ ,  $2n$ ,  $2n + 1$ ,  $2n + 2$ .

2. Most rátérünk annak igazolására, hogy  $2n$ -nél több méh nem lehet.

Legyen a méhek száma  $k$ . Jegyezzük fel az összes méh összes (fához) érkezési időpontját, legyen ezek száma  $T$ . Mivel minden méh legfeljebb  $n$ -szer járt a fánál, ezért  $T \leq kn$ . (Ha két méh valamikor egyszerre érkezett, azt is számoljuk két érkezési időpontnak.)

Másrészt bármely két méh találkozásához hozzárendelhető a találkozásuk kezdete, ami a később érkezőnek az érkezési időpontja (illetve bármelyiké, ha egyszerre érkeztek). Mivel egyidejűleg csak két méhecske lehet a fánál, ezért ezek a találkozáskezdetek mind különbözők, azaz legalább  $k(k - 1)/2$  találkozáskezdet van. Az érkezési időpontok száma ennél legalább 1-gyel több, hiszen az elsőként érkező méhecske érkezési időpontja nem találkozáskezdet (illetve ha az elején ketten egyszerre érkeztek, akkor a két érkezési időpont csak egyetlen találkozáskezdetet eredményez). Ennek megfelelően  $T > k(k - 1)/2$ .

A  $T$ -re adott becsléseket összevetve kapjuk, hogy  $k(k - 1)/2 < kn$ , azaz  $k - 1 < 2n$ , tehát  $k \leq 2n$ .